

Ulteriori informazioni

Opuscoli

- **Il cancro dell'intestino:**
Le principali domande e risposte
- **Lo screening del cancro coloretta**
- **Il cancro coloretta**

Gli opuscoli si possono ordinare

- Tel. 0844 85 00 00
- shop@legacancro.ch
- www.legacancro.ch/opuscoli

Internet

www.legacancro.ch/cancrointestino

Impressum

Herausgeberin
Lega svizzera contro il cancro (LSC)
Effingerstrasse 40
Casella postale 8219
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
www.legacancro.ch
IBAN: CH95 0900 000 3000 4843 9

2a edizione
Editoriale
Eveline Bossart, specialista della prevenzione

Edizione precedente
Dr. med. Karin Huwiler;
Cornelia Schwager;
sia la Lega svizzera contro il cancro, Berna

Design
Lega svizzera contro il cancro, Berna

Foto
Stefan Kubli, Zurigo

Stampa
Hartmann Druck und Medien GmbH

Questa scheda informativa è disponibile anche in tedesco e in francese.

© 2023, 2015, Lega svizzera contro il cancro, Berna | 2a edizione riveduta

La Lega contro il cancro s'impegna affinché ...

- ... meno persone si ammalino di cancro,
- ... meno persone soffrano e muoiano di cancro,
- ... più persone possano essere guarite dal cancro,
- ... le persone malate ed i loro familiari vengano ascoltati e aiutati in tutte le fasi della malattia e nella morte.



lega contro il cancro

Il modello d'intestino percorribile

Un'offerta della Lega contro il cancro

I nostri opuscoli sono disponibili gratuitamente solo grazie alle donazioni.

Donate ora con TWINT:




Scansionare il codice QR con l'app TWINT.



Inserire l'importo e confermare la donazione.



Oppure online su www.legacancro.ch/donazione.



Il modello d'intestino percorribile

Lo sapeva che, con circa 4500 casi all'anno, il cancro del colon è uno dei tumori più frequenti in Svizzera? Ogni anno, circa 1650 persone muoiono per le sue conseguenze.

Prima il cancro del colon viene scoperto, prima può essere curato. Gli esami principali per la diagnosi precoce sono il test del sangue nelle feci e la colonscopia.

Camminando all'interno del modello di intestino, può vedere come nel colon i polipi si trasformano in un tumore maligno.



4) Cancro dell'intestino con perforazione

Da un polipo non rilevato e non rimosso può svilupparsi un tumore maligno. Il cancro può accrescersi nello spessore della mucosa e dello strato muscolare della parete intestinale, provocandone la perforazione verso l'esterno. Il cancro può anche dare origine a metastasi (tumori a distanza) in altri distretti dell'organismo.



3) Moncone di polipo

I polipi possono essere individuati e anche asportati immediatamente nel corso dell'endoscopia dell'intestino. Dopo rimozione di un polipo residua un moncone. In questo punto, o anche in altri tratti dell'intestino, possono formarsi successivamente nuovi polipi.



2) Polipi

Nella maggior parte dei casi, il cancro coloretale si sviluppa da escrescenze benigne chiamate «polipi». I polipi sono frequenti. Ne esistono di due tipi: quelli che non rischiano di trasformarsi in cancro e quelli che invece possono diventare maligni. Questi ultimi sono chiamati «adenomi».

Il cancro coloretale di solito si sviluppa lentamente. Spesso un adenoma benigno impiega una decina d'anni per degenerare in tumore maligno. Esistono però alcuni polipi, come quelli piani, che possono trasformarsi più rapidamente in cancro.



Polipo lungo



Polipo corto



Polipo piatto



Polipo ampio



1) Diverticoli

I diverticoli sono piccole sacche della mucosa che sporgono dalla parete dell'intestino crasso. Non sono precursori di un cancro coloretale.

